

Connaissances, Attitudes, et Comportements vis-à-vis des IST/sida



L'Enquête Démographique et de Santé et à
Indicateurs Multiples (EDS-MICS II)
Comores 2012


- **Connaissance du VIH/sida**
- Attitudes et comportements
- Test du VIH
- Sida et les jeunes

Connaissance du VIH/sida

96 % des femmes et **99 %** des hommes de 15-49 ans ont **entendu parler du sida**.

Connaissance des moyens d'éviter le sida

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans




Rejet des idées erronées

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui savent que :

Une personne paraissant en bonne santé peut cependant avoir le virus du sida



Le sida ne peut pas être transmis par les moustiques



Le sida ne peut pas être transmis par des moyens surnaturels



Le sida ne peut pas être transmis en partageant la nourriture d'un malade du sida



■ Femmes
■ Hommes


Connaissance « approfondie » du sida...

- Sont considérés comme ayant une « connaissance complète », les femmes et les hommes qui
- **déclarent qu'on peut réduire** le risque de contracter le virus du sida en utilisant des **condoms** et en limitant les rapports sexuels à **un seul partenaire** fidèle et qui n'est pas infecté
- **Rejettent les idées locales erronées** les plus courantes à propos de la transmission du sida (transmission par les moustiques et par des moyens surnaturels)
- Savent qu'une personne paraissant **en bonne santé peut avoir le virus** du sida

Connaissance approfondie


Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans

■ Femmes ■ Hommes



Connaissance de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant


Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui savent que...



- Connaissance du VIH/sida
- **Attitudes et comportements**
- Test du VIH
- Sida et les jeunes

Attitudes de tolérance

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui :



Partenaires sexuels multiples

- Au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête :
 - **2 %** des femmes et **12 %** des hommes de 15-49 ans ont eu, au moins, deux partenaires sexuels
- Parmi ceux qui ont eu deux partenaires sexuels au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête :
 - **15 %** des femmes et **37 %** des hommes de 15-49 ans ont déclaré qu'un condom avait été utilisé durant les derniers rapports sexuels


- Connaissance du VIH/sida
- Attitudes et comportements
- **Test du VIH**
- Sida et les jeunes

Test du VIH/sida

32 % des femmes et **50 %** des hommes
savent où aller pour effectuer
un test du VIH

Test du VIH/sida

Pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15-49 ans



Tests du VIH au cours des 12 derniers mois

4 % des femmes et **6 %** des hommes
ont effectué un test et ont reçu le résultat
au cours des 12 derniers mois

Tests du VIH pour les femmes enceintes


6 % des femmes enceintes ont reçu des conseils sur le VIH, ont effectué un test du VIH au cours d'une visite prénatale et ont reçu le résultat

- Connaissance du VIH/sida
- Attitudes et comportements
- Test du VIH
- **Sida et les jeunes**

Connaissance approfondie par les jeunes

*Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-24 ans avec une connaissance approfondie**


■ Femmes ■ Hommes



Une connaissance approfondie veut dire qu'ils : déclarent qu'on peut réduire le risque de contracter le virus du sida en utilisant des condoms et en limitant les rapports sexuels à un seul partenaire fidèle et qui n'est pas infecté, rejettent les idées locales erronées (transmission par les moustiques et par des moyens surnaturels), et savent qu'une personne paraissant en bonne santé peut avoir le virus du sida.

Connaissance d'un endroit où se procurer des condoms


Pourcentage des jeune femmes et jeunes hommes de 15-24 ans qui savent où se procurer des condoms



Âge auquel les jeunes ont eu leurs premiers rapports sexuels

Pourcentage des jeunes qui ont eu leurs premiers rapports sexuels

■ Jeunes femmes ■ Jeunes hommes




Rapports sexuels et utilisation du condom

Pourcentage de femmes et d'hommes célibataires de 15-24 ans

■ Femmes ■ Hommes


Parmi ceux ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois



Test du VIH/sida parmi les jeunes

Parmi les femmes et les hommes de 15 - 24 ans ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant effectué un test du VIH au cours des 12 derniers mois et ayant reçu le résultat

■ Femmes ■ Hommes



Principaux résultats

- **61 %** des femmes et **80 %** des hommes savent que l'on peut réduire les risques de contracter le VIH en **utilisant des condoms** et en **limitant les rapports sexuels à un seul partenaire** fidèle et non infecté
- **2 %** des femmes et **12 %** des hommes ont eu, au moins, deux partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois.
- **86 %** des femmes et **83 %** des hommes **n'ont jamais effectué de test du VIH.**
- **19 %** des femmes et **24 %** des hommes âgés de 15-24 ans ont **une connaissance « approfondie » du sida**