

# Paludisme




L'Enquête Démographique et de Santé et à  
Indicateurs Multiples (EDS-MICS II)  
Comores 2012

- **Disponibilité et utilisation des moustiquaires**
- Traitement préventif des femmes enceintes
- Traitement des enfants

# Disponibilité de moustiquaires selon la résidence

*Pourcentage de ménages possédant au moins une moustiquaire*


■ Comores ■ Urbain ■ Rural



MII: Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide  
MILDA: Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide à Longue Durée d'Action


# MII dans la sous-région

*Pourcentage de ménages possédant au moins une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII)*




# Disponibilité de moustiquaires par niveau socio-économique

*Pourcentage de ménages possédant au moins une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII)*



# Disponibilité des MII par île




# Accès à une MII

**41 %** de la population de fait des ménages **ont accès à une MII**, c'est-à-dire qu'elle pourrait dormir sous une MII si chaque MII du ménage était utilisée par deux personnes au maximum.


# Utilisation des moustiquaires par les enfants et les femmes enceintes

*Pourcentage d'enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes de 15-49 ans qui ont dormi sous une MII la nuit ayant précédé l'enquête*

**Dans tous les ménages**



**Dans les ménages avec au moins une MII**




MII: Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide



# Pulvérisation intradomiciliaire d'insecticide résiduel (PID) contre les moustiques


*Pourcentage de ménages dont les murs intérieurs du logement ont été pulvérisés au cours des 12 derniers mois*



- Disponibilité et utilisation des moustiquaires
- **Traitement préventif des femmes enceintes**
- Traitement des enfants

# Traitement Préventif Intermittent

*Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des deux années ayant précédé l'enquête*




- Disponibilité et utilisation des moustiquaires
- Traitement préventif des femmes enceintes
- **Traitement des enfants**

# Traitement des enfants

*Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans*

Parmi les enfants ayant eu de la fièvre



\* CTA: combinaison thérapeutique à base d'artémisinine

# Antipaludiques pour le traitement des enfants

Parmi les enfants de moins de cinq ans ayant eu de la fièvre au cours des deux semaines avant l'enquête et qui ont pris des antipaludiques :

**46 %** ont pris SP/Fansidar

**21 %** ont pris de la Chloroquine

**18 %** ont pris de la Quinine

**16 %** ont pris de CTA

**11 %** ont pris un autre antipaludique

**3 %** ont pris de la Amodiaquine

# Principaux résultats

- **59 %** des ménages possèdent une **Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII)**
- **41 %** de la population de fait des ménages **ont accès à une MII**
- **41 %** des enfants de moins de cinq ans et **44 %** des femmes enceintes de 15-49 ans **ont dormi sous une MII la nuit ayant précédé l'enquête**
- **28 %** des femmes enceintes ont pris **deux doses ou plus** de la **SP/Fansidar, au moins une au cours d'une visite prénatale**
- Pour **28 %** d'enfants ayant eu de la fièvre, on a prélevé du sang pour être testé